

17. LE LEZARD HISPANIQUE

Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)

Description

Tronc fin et aplati (allure plus gracile que *P. muralis*). Queue moins de 2 fois plus longue que le tronc et la tête réunis. Tête déprimée à museau pointu. Ecailles dorsales lisses et minuscules. Ventrales subrectangulaires. Généralement 4 supralabiales de la rostrale à la suboculaire. Plaque massétérique pouvant être unique, mais le plus souvent divisée ou absente. Présence d'une douzaine d'écailles temporales (17). Collerette formée de 8 à 11 écailles.

Dos brun grisâtre, vert, olivâtre, taché ou marbré de dessins clairs et sombres. Rarement présence d'une bande vertébrale sombre, discrète ou très large, interrompue ou non. Flancs brunâtres ou noirâtres, piquetés d'ocre ou brun clair, et surmontés d'une ligne dorsolatérale blanchâtre continue ou non, apparaissant parfois comme une série d'ocelles cerclées de sombre. Parties ventrales blanchâtres, grisâtres, rosées, chamoisées, orangées. Gorge presque toujours unie ou ornée de petits points. Queue identique au tronc (quelquefois cependant moins tachetée de sombre) chez l'adulte, bleu-vert. Longueur museau-cloaque de 39 à 80 mm. Longueur totale pouvant atteindre exceptionnellement 220 mm.

Dimorphisme sexuel

Mâles : membres plus longs, implantés plus en arrière (17) ; dos plutôt vert avec de larges taches irrégulières. Femelles : tête plus aplatie ; longueur museau-cloaque plus petite (en moyenne environ 43 mm au lieu de 47 (17) ; dos orné de séries longitudinales et parallèles de taches sombres, peu marquées chez la petite forme française.

Milieu

Fréquente les vieux murs, les rochers, les talus de bord de routes, les éboulis, les

troncs des arbres. Espèce anthropophile pouvant habiter des jardins, des parcs en zone urbaine. Peut se rencontrer jusqu'à 1 800 m d'altitude. Milieux ensoleillés.

Alimentation

Régime composé d'Invertébrés, et en particulier d'araignées, de Coléoptères, de larves de Lépidoptères.

Reproduction

Ponte en mai de 2 à 5 œufs oblongs (\varnothing de 6 mm sur 11-12 mm) dans des crevasses de mur, sous des pierres, des troncs ou des décombres (1). Incubation d'une soixantaine de jours. Le nouveau-né mesure quelque 50 mm, dont environ 23 mm pour le tronc et la tête. Défense active de leur territoire par les mâles à la période des amours.

Mœurs. Cycle annuel d'activité

Espèce pouvant présenter un comportement grégaire. Aime à grimper sur des supports verticaux ou obliques. Diurne, il se réfugie cependant dans son abri aux heures de plus fortes chaleurs. Son rythme hivernal est mal connu.

Répartition

Espèce iberomaghrébine. En Tunisie, aire descendant au Sud jusque vers Kasserine. Occupe tout le Portugal et l'ensemble de l'Espagne, sauf au Nord les Asturies, les monts Cantabriques, la Navarre. Remonte le long de la côte méditerranéenne en France dans le golfe du Lion. Mathon (23) émet plusieurs hypothèses pour expliquer le peuplement « à cheval » sur 2 continents de ce lézard : migration espagnole par un pont béticorifain, avant les glaciations vers le Maroc puis vers l'Est ; migration italienne par un pont siculo-tunisien, de la Sicile vers la Tunisie puis vers l'Ouest. Les auteurs modernes ne sont pas tous d'accord sur la validité des 4 sous-espèces décrites. Selon Guillaume, Wolff & Geniez (18), 2 formes seraient présentes en France. La plus grande, *Podarcis hispanica hispanica*,




Forme « petite » (Valros, Hérault, août 1984).

habite surtout la Catalogne espagnole et les Pyrénées jusqu'à une altitude de 1 100 m, et pénètre dans les Pyrénées-Orientales (Fontpedrouse, Banyuls) où ses populations vivent parfois en sympatrie avec *P. muralis*.

Une forme plus petite, campagnarde, (*P.h. cebennensis*, Guillaume & Geniez*) existe de plusieurs départements méridionaux : Aude (Est de Carcassonne), Hérault, Gard, Aveyron (Sud-Est), Lozère (Sud), Ardèche (Ouest). Magraner et Michelot (com. pers.) l'ont observé au-dessus de Valence, Drôme, dans le Parc régional du Pilat. Absente de Camargue et des zones de haute altitude. Ne passe pas à l'est du Rhône (Guillaume, com. pers.).

* (en préparation) : Une nouvelle sous-espèce de *Podarcis hispanica* Steindachner, 1870 : *Podarcis hispanica cebennensis*.



17. Lézard hispanique :
P. h. hispanica, *P. h. cebennensis*.