



Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878

Familia: LACERTIDAE



Autor: José Julián García

LEGISLACIÓN:


- Directiva Hábitat: Anexos II y IV.
- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: interés especial.
- Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: interés especial.

DESCRIPCIÓN:

Lagarto robusto de tamaño mediano. Los adultos pueden alcanzar una longitud cabeza-cuerpo de 131 mm, siendo las hembras mayores que los machos. Éstos presentan en el dorso una coloración verdosa finamente punteada de negro; el vientre es amarillento con manchas negras y en librea de celo azulean intensamente las mandíbulas y garganta. Las hembras tienen el dorso generalmente pardo con grandes manchas negras y ocelos blancos en los costados. Los juveniles son de color pardo, con los costados moteados de ocelos y manchas amarillentos o blancos.

DISTRIBUCIÓN:

Endémico de la península Ibérica, originado en el sector noroccidental. Coloniza las dos vertientes de la franja cantábrica. Por el sur desciende la costa atlántica portuguesa, alcanza el Sistema Central y aparece en poblaciones aisladas en sierras de Andalucía y Extremadura. Remonta desde el nivel del mar hasta los 2100 m. Ocupa áreas con precipitaciones anuales mínimas de 600-800 mm. En el País Vasco es una especie rara, dispersa en puntos aislados de la costa y, en general, la vertiente atlántica. No se ha encontrado en Donostia-San Sebastián, pero ha sido citado en áreas cercanas, como Jaizkibel, extremo oriental de su distribución, sin llegar a sobrepasar el Bidasoa.



HÁBITAT:

Especie forestal, propia tanto de marojales y robledales como de pinares. Ocupa hábitats variados, en zonas arbustivas, helechales y muros de piedra flanqueados de matorral, donde abundan los refugios y lugares de soleamiento. En las zonas menos pluviosas los adultos



Autor: Aitziber Egaña-Callejo

seleccionan hábitats húmedos, en las riberas de los arroyos. Los juveniles prefieren las orillas de los prados y pastizales. Parece establecer competencia con su congénere el lagarto verde, de requerimientos ecológicos parecidos, de manera que sus respectivas distribuciones resultan bastante excluyentes, aun cuando las condiciones bioclimáticas les resulten favorables a ambos.

FACTORES DE RIESGO:

La destrucción de los bosques caducifolios y de la vegetación original en las orillas de ríos y arroyos, así como la alteración de los caudales de los cursos de agua, afectan negativamente a la especie, también sensible a la contaminación de los medios acuáticos. Las poblaciones aisladas en el sur de su distribución son las más vulnerables. Su presencia puntual en el País Vasco responde a factores biogeográficos y de competencia, frente a la potencialidad del hábitat, que es alta.