

# LEZARD SICILIEN

*Podarcis sicula* Rafinesque



*Podarcis sicula campestris*, Bologna.

P. van den Elzen

## RÉPARTITION.

A part la Corse où il est largement répandu, le Léopard sicilien a été signalé dans les cinq départements provençaux (Knoepffler, 1961). Actuellement, sa présence est sûre à Toulon.

## TAILLE.

26 à 30 cm.

## COLORATION.

Il existe une grande polychromie qui correspond à de nombreuses sous-espèces. Ce Léopard présente cependant toujours une large bande vertébrale, plus ou moins floue, tachetée et bordée de noir. La face dorsale est typiquement verte, jaunâtre, vert olive, brun clair ou grisâtre. Les flancs brun sombre ou grisâtres sont ornés d'ocelles blanchâtres et noirs, sur un ou deux rangs. Le dessus de la tête est brun clair ou gris bleuté. La face ventrale, gris vert, blanchâtre ou teintée de verdâtre, porte des petits points bleus sur les ventrales externes.

## BIOTOPES.

Il s'adapte à de nombreux biotopes : les endroits herbeux, les bordures de routes, les champs dégagés, les terrains en friche, les vignobles et les endroits sablonneux bordant la mer.

## COMPORTEMENT.

Il est très vif et bon grimpeur. Lorsqu'il est capturé, il mord facilement.

## HIVERNAGE.

Octobre - novembre à février - mars.

## NOURRITURE.

Il chasse sur le sol divers petits Invertébrés constituant l'essentiel de sa nourriture qui comporte toutefois une proportion assez élevée de matière végétale.

## REPRODUCTION.

La femelle pond d'avril à juin de 2 à 10 œufs mesurant 10 à 12 mm de long. L'incubation dure 9 à 11 semaines. Les jeunes à la naissance mesurent 5,5 à 6,5 cm.



*Podarcis sicula*, mâle (en haut) et femelle.

G. Naulleau