

---

**Lagartija roquera**  
*Podarcis muralis rasquinetti*  
(Bedriaga, 1878)



**Unidad operativa de conservación**

*Podarcis muralis* es una especie politépica que se divide en una veintena de subespecies, si bien no existe acuerdo sobre las diferentes subespecies ibéricas. Aunque se admite generalmente que algunos islotes asturianos estarían ocupados por *P. muralis rasquinetti* (Pérez-Mellado, 1998; Gruschwitz y Böme, 1986, en Pérez-Mellado, 1998) no se reconoce esta subespecie, que se incluye en la subespecie *brogniardi*, propia del área cantábrica.

Se toma como unidad operativa de conservación a toda la población de *P. m. rasquinetti*.

**Protección legal**

**Autonómica**

CREA propuesto: «de interés especial-situación incierta»

**Estatal**

CNEA: «de interés especial»

**UE**

Directiva Habitats: Anexo IV

**Convenios internacionales**

Convenio de Berna: Anexo II

**Categorías UICN**

**Autonómica**

*P. muralis*: LC

*P. m. rasquinetti*: DD

**Estatal**

*P. muralis*: LC (2002)

*P. m. rasquinetti*: DD (2002)

**Europea**

*P. m. rasquinetti*: DD (2002)

**Mundial**

*P. m. rasquinetti*: LC

**Justificación de los criterios**

La mayoría de las poblaciones de Lagartija roquera de la Península se hallan en un estado de conservación satisfactorio, puesto que no se tienen datos concretos de la subespecie *P. m. rasquinetti*, de su validez taxonómica o de su estado de conservación.

Se propone por tanto para esta subespecie la categoría DD, a la espera de más información (Pérez-Mellado, 2002).

**Situación y tendencia de la población**

No se sabe bien cual es la distribución de esta subespecie y menos aún la tendencia de sus poblaciones. La insularidad en pequeños islotes las puede hacer muy vulnerables. Además, la presencia de ratas en algún islote y el aumento de la población de gaviotas patiamarillas podrían tener un efecto negativo sobre esta subespecie.

**Distribución**

**En Asturias** la especie se distribuye por toda la comunidad autónoma, mientras que la subespecie *P. m. rasquinetti* sólo se ha citado en la Peña la Deva, Herbosa e islotes del entorno del Cabo Peñas y los castros de Poo y Ballota, en Llanes (Klemmer, 1964).

**En España** es una especie propia de la franja eurosiberiana ibérica (Diego-Rasilla, 2004). Se distribuye por el extremo norte peninsular (Pirineos, prepirineo y Cordillera Cantábrica), constituyendo los Sistemas Central (Sierras de Ayllón y Guadarrama) e Ibérico, y la Sierra de Gúdar y el Macizo de Peñagolosa (Castellón), sus límites meridionales de distri-

bución. No está presente en la Submeseta Norte (Pérez-Mellado, 2002). Parece estar restringida a zonas con más de 800 mm de precipitación anual.

**En Europa** la especie está presente en una amplia franja meridional que va desde la Turquía europea y las costas del Mar Negro hasta la Península Ibérica, con excepción de parte del sur de Italia y parte de la Iberia seca (Pérez-Mellado, 2002).

**En el mundo** sólo se encuentra en Europa (Pérez-Mellado, 2002).

### Hábitat


La especie se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde construcciones humanas hasta bosques caducifolios, y desde el nivel del mar hasta los 2 100 m. La subespecie *P. m. rasquinetti* sólo se encuentra en islotes rocosos costeros de Asturias con algo de vegetación, tanto en sustrato calizo como en silíceo.

### Amenazas

- **Contaminación genética** por la introducción de individuos procedentes de la costa que, a medio o largo plazo pueden destruir las características genéticas propias de la subespecie.

### Mapas de distribución

#### Asturias



- **Proliferación** de posibles **depredadores** en los islotes, como ratas y la gaviota patiamarilla.
- **Introducción de animales domésticos** en islotes como conejos y cabras.
- **Quema de matorral costero.**

### Medidas de conservación

#### Propuestas:

- Estudio taxonómico de la especie para confirmar su estatus y su situación con mayor precisión, ante la duda de la validez subespecífica o la identificación de un linaje independiente de las lagartijas continentales.
- Evitar introducciones de otros lacértidos en las islas, especialmente otras poblaciones de *P. muralis*.
- Control de todas las especies introducidas en los islotes.

#### España

