

Lacerta peloponnesiaca Bib. u. Bory.

- 1 ♂, 1 ♀, Kalamata (am Straßengraben), 6. VI.,
1 ♂, 1 ♀, 1 juv., Karkalis am Fluß Lusios, Nebenfluß des Alfios
(auf Schiefer), 8. VI.,
3 ♂, 1 ♀, Vythina (= Bythina), etwa 1100 m hoch, 8.—27. VI.,
1 ♂, 2 ♀, Langadia (auf Schiefer), 700 m hoch, 8. VI.,
5 ♂, 2 ♀, Ruinen von Olympia, 9.—10. VI.,
2 ♂, 5 ♀, Umgebung von Divri (Kapellio), Eichen- und Tannenwald,
bis 1000 m hoch, Elis, 11.—12. VI.,
1 ♂, 1 ♀, Mega Spileon bei Kalawrita, 800 m hoch, 14. VI.,
1 ♀, Berg Chelmos, 1150 m hoch, 18. VI.,
1 ♂, 3 ♀, Gura am Pheneos-See, 1200 m, Kalk, 19. VI.,
2 ♂, 1 ♀, Killene oberhalb Busi, 1400—1600 m hoch, 21. VI.,
5 ♂, 2 ♀, Lavka und Kastania am Stymphalos-See, 23.—24. VI.,
1 ♂, 2 juv., zwischen Kandila und Levidi, 25. VI.,
1 ♂, Levidi, 25. VI.

Alle vom Peleponnes, leg. G. Niethammer 1942.

Diese im Peloponnes weit verbreitete und für ihn charakteristische Eidechse kommt bei Gura am Pheneos-See mit *L. erhardii livadhiaca*, zwischen Kandila und Levidi mit *L. danfordii graeca*. im Eichenwald bei Divri mit *L. strigata* subspec.? und *L. taurica ionica* und am Berg Killene in den lichten Nadelwäldern mit *L. muralis albanica* und *L. taurica ionica* zusammen vor. Dort erreicht sie mit 1600 m auch die höchste bisher bekanntgewordene Höhe.

Zu systematischen Bemerkungen gibt das vorliegende Material keine Veranlassung. Ihre sicherlich nahe Verwandtschaft zu *L. taurica* wäre hervorzuheben.