



RAMARRO OCCIDENTALE

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Nomi vernacolari: **Lajö, Leirö, Lagö, Angö, Laiö**

NOTE TASSONOMICHE - In base a recenti studi è stata distinta da *L. viridis* (AMANN et al., 1997). Alla luce delle recenti revisioni sistematiche la tassonomia intraspecifica è completamente da ridefinire.


DISTRIBUZIONE - Il Ramarro occidentale è una specie a distribuzione mediosudeuropea occidentale (SCALI & MABEL SCHIAVO, 2004). Nella provincia di Savona è probabilmente presente in tutto il territorio, la mancanza di segnalazioni per alcuni comuni è causata da difetti di ricerca. La presenza della specie si rileva dal livello del mare fino a circa 1000 metri di altitudine.

DESCRIZIONE - Sauro di medio-grandi dimensioni che raramente supera i 45 cm di lunghezza totale. I maschi hanno dimensioni maggiori delle femmine ed hanno una testa più grande e massiccia. Il colore predominante è il verde, spesso reticolato di nero con sfumature gialle e beige. La gola dei maschi durante il periodo riproduttivo assume una colorazione blu intenso. I neonati presentano una lunghezza totale compresa tra i 3 ed i 6 cm.

HABITAT - Specie ad ampia valenza ecologica la si può osservare in quasi tutti gli ambienti presenti in provincia di Savona. Frequenta preferenzialmente aree con densa vegetazione arbustiva.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE – Ovipara, la femmina depone da 5 a 53 uova (SCHIAVO & VENCHI, 2006).

STATUS - Basso rischio.



	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Periodo di attività												
Periodo riproduttivo												

