


Lagartija andaluza *Podarcis vaucheri*

PREOCUPACIÓN MENOR


Identificación. Lagartija rupícola de pequeño tamaño. Machos en celo con el dorso verde en el centro, pardo en parte anterior, y retículos de manchas negras que forman dos o más series longitudinales. Hembras adultas e inmaduros con el dorso y costados pardos. Parte inferior blanco o naranja pálido. Juveniles con cola verde intenso. Talla mayor y menor pigmentación en poblaciones litorales y de zonas secas.

Tamaño. LHC media de adultos 50,2 mm (machos) y 52,7 mm (hembras).

Historia natural. Endemismo ibero-magrebí, con límite norte de su distribución ibérica aún no bien precisado, introducida en Murcia y la isla de Alborán; las cuadrículas en negro indican ejemplares identificados genéticamente. Habita paredes, tanto naturales como artificiales, y troncos caídos en ausencia de rocas. Activo principalmente en primavera y verano, aunque también el resto del año en días soleados. Celo desde febrero y durante la primavera. Puesta, de 2-4 huevos, mayoritariamente entre abril y junio, aunque parecen existir segundas puestas en verano.




Una postnasal, timpánica presente y masetérica ausente o fragmentada. Supratemporales pequeñas




Pigmentación oscura abundante en pileo de machos



Pequeños puntos oscuros bajo cabeza y cuello. Collar liso



Ventrales no imbricadas, dispuestas en seis series longitudinales y con manchas oscuras en las externas



▲ Lagartija andaluza macho de zonas húmedas



Lagartija andaluza de zonas secas ►