

LUCERTOLA MURAIOLA*Podarcis muralis* Laurenti 1768

ORDINE SQUAMATA

SOTTORDINE SAURIA

FAMIGLIA LACERTIDAE

GEONEMIA: Entità mediosudeuropeo-anatolica, assente nella maggior parte della Penisola Iberica e delle isole mediterranee.

CARATTERI DISTINTIVI: Specie molto variabile, in regione è rappresentata da esemplari a colorazione dorsale bruna con bande dorsolaterali bruno scure o nere, oppure verde con reticolatura nera. Il ventre e la gola sono sempre più o meno macchiati di nero e ciò consente di distinguere la specie da *P. sicula*. La squama rostrale non è in contatto con la frontonasale per l'interposizione delle nasali anteriori. Squame ventrali di forma subrettangolare. Lunghezza totale massima 23 cm.

HABITAT: Aree urbane e zone rurali, in muri a secco, abitazioni, ruderi, giardini, cataste di legna, pietraie, margini di strade, massicciate ferroviarie. Alvei di torrenti, sponde di laghi, stagni e cave, emergenze rocciose, boschi e radure.

BIOLOGIA: Vivace e agile arrampicatrice, preda vari invertebrati terrestri. I maschi sono fortemente territoriali e si azzuffano spesso per il predominio di un determinato territorio. Le femmine depongono da 2 a 12 uova anche 2-3 volte l'anno in buche scavate con gli arti anteriori. La latenza invernale inizia in ottobre-novembre, sotto sassi, in fenditure delle rocce, in gallerie spesso scavate dall'animale stesso o in tane di roditori abbandonate.

NOTE TASSONOMICHE: Specie politipica, suddivisa in numerose sottospecie, di cui almeno 3 rappresentate in regione: *P. muralis brueggemanni* (Bedriaga 1879) diffusa dalla Liguria fino al Lazio, tipica della Romagna e di varie località dell'Appennino emiliano (Val Nure, Val Grondana, Val Boreca, Val Perino, PC); *P. muralis maculiventris* (Werner 1891) tipica della pianura padano-veneta; *P. muralis acrolampra* (Costa 1839) diffusa dalla Liguria all'Aspromonte. Quest'ultima è ampiamente sostituita in vaste porzioni dell'Appennino regionale dalla già citata ssp. *brueggemanni*. ZANGHERI (1969) attribuisce gli esemplari da lui osservati in Romagna alla ssp. *muralis* (Laurenti 1768).

DISTRIBUZIONE REGIONALE: Specie ubiquitaria distribuita in tutto il territorio regionale: è sicuramente più diffusa di quanto evidenziato dalla mappa.



Foto G. Stagni

