

***Podarcis lilfordi* (Günther, 1874)**

Castellano: Lagartija balear

Catalán: Sargantana balear

Vasco: Sugandila balearra

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: VULNERABLE

ENDEMISMO ESPAÑOL

DISTRIBUCION

Exclusivamente en las islas Baleares. Se encuentra en la isla de Cabrera y en 15 islotes de su archipiélago, en ocho islotes del archipiélago de Mallorca y en 13 del de Menorca. Se han producido, asimismo, introducciones esporádicas en islas mayores (1).

HABITAT

Los islotes donde habita la especie se caracterizan normalmente por la escasez o ausencia de predadores, la pobreza de vegetación y fauna y la presencia estacional de aves marinas (1, 2).

POBLACION

Su abundancia relativa es muy variable, dependiendo de cada población. En Cabrera, por ejemplo, alcanza grandes densidades, mientras que en algunos islotes (Fonoi Petit, en Cabrera) se estimó una población total de 10 individuos (1).

AMENAZAS

La especie, como tal, no presenta amenazas que pongan en peligro su supervivencia. No obstante, ciertas poblaciones están amenazadas por el coleccionismo, el comercio y la transformación del hábitat. Como todas las especies insulares, es particularmente sensible a la predación y competencia por parte de especies introducidas (3, 4). La categoría de amenaza es variable para cada subespecie descrita; así, aunque globalmente la especie es considerada vulnerable, algunas subespecies no entran en esta categoría, como se expone a continuación:

NA: *P. l. giglioli* (Bedriaga, 1879); se halla en Dragonera, frente a la costa oeste de Mallorca.

P. l. kuligae (Müller, 1927); se encuentra en Cabrera y algunos islotes al sur de esta isla.

P. l. lilfordi (Günther, 1874); habita en la isla del Aire, frente a la costa sureste de Mallorca.

- E: *P. l. addayae* (Eisentraut, 1928); se encuentra en Addaya Petita, al norte de Menorca.
P. l. codrellensis Pérez Mellado y Salvador, 1988; vive en el islote de Codrell, al sur de Menorca.
P. l. esponjicola (Salvador, 1977); se halla sólo en la isla L'Esponja, al norte de Cabrera.
P. l. fenni (Eisentraut, 1928); vive en la isla de Nitge, al norte de Menorca.
P. l. hartmanni (Wettstein, 1937); se encuentra en la isla Malgrats, al oeste de Mallorca.
P. l. imperialensis (Salvador, 1977); endémica de la isla Imperial, al sur de Cabrera.
P. l. porrosicola Pérez Mellado y Salvador, 1988; habita en la Isla Porros, al norte de Menorca.
P. l. toronis (Hartmann, 1953); vive en la isla Toro, al oeste de Mallorca.
- Ex: *P. l. rodriguezi* (Müller, 1927); vivía en la Isla de las Ratras, que fue destruida al construir el puerto de Mahón.

MEDIDAS DE CONSERVACION

Las medidas activas de conservación deben centrarse en las poblaciones más amenazadas, donde, dependiendo de las circunstancias, se ha recomendado la aplicación efectiva de las leyes que prohíben su captura y comercio, protección del hábitat, etc. En general, se deben realizar campañas de sensibilización y hacer un esfuerzo por controlar, en la medida de lo posible, las especies introducidas. Las poblaciones "En Peligro" podrían necesitar programas de cría en cautividad (3, 4). Sería deseable la inclusión de la especie en el Convenio de Washington.

REFERENCIAS

1. Barbadillo, L. J. (1987): *La guía de INCAFO de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. INCAFO, Madrid.
2. ICONA (1986): *Lista Roja de los Vertebrados de España*. MAPA. Madrid.
3. Honegger, R. E. (1981): «Threatened Amphibians and Reptiles in Europe». Supplementary Volume of *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas*. European Committee for the Conservation of the Nature and Natural Resources (Ed.). Council of Europe. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden.
4. Pérez Mellado, V., y Salvador, A. (1988): «The Balearic Lizard *Podarcis lilfordi* (Günther, 1874) of Menorca» *Arquivos do Museu Bocage*, 1 (10): 127-195.