

PSAMMODROMUS HISPANICUS, Fitzinger, 1826. **Lagartija cenicienta.**



DESCRIPCION

Lagartija de cabeza relativamente pequeña y con la cola de 1,5 a 2 veces la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos. Las escamas dorsales están carenadas pero, a diferencia de la lagartija colilarga, las escamas laterales del cuello son granulares y además presenta un collar poco marcado pero bien visible. El color del dorso es grisáceo, oliváceo o terroso, surcado por cuatro bandas más o menos discontinuas y de coloración blanquecina, entre las que se disponen manchas negras irregulares. En los costados pueden existir, además, de una a tres bandas adicionales. Partes inferiores blancuzcas. Los machos en celo presentan una mancha verdosa por encima de los hombros que puede llegar hasta el tímpano. Alcanza los 150 mm de longitud total

BIOLOGIA

En Cádiz observamos un período de actividad que va desde febrero a noviembre. Se alimenta principalmente de insectos y arácnidos que no sobrepasen los 20 mm de longitud. La puesta tiene lugar generalmente en Mayo, aunque se observan hembras grávidas hasta Junio. Los autores hemos encontrado en Marzo, bajo una piedra, una hembra grávida con cuatro huevos en su interior que había sido cazada por un escorpión. Los huevos medían 12-13 x 6-7 mm

HABITAT


Tiene preferencia por los lugares despejados en donde la cobertura vegetal es escasa y de poco porte. Asimismo se la encuentra en pastizales, llanuras pedregosas y, en alguna ocasión, la hemos observado en zona de bosque, ocupando entonces los claros que están muy bien soleados.

STATUS Y DISTRIBUCION

La lagartija cenicienta es un animal bastante más escaso que su pariente, la lagartija colilarga. Siempre la encontramos de forma aislada y repartida por casi toda la provincia, hasta unos 800 m de altitud.

OBSERVACIONES

La subespecie que habita nuestra provincia es *Ps. b. hispanicus* que, además, se encuentra por toda Andalucía, centro de España y Portugal. Esta subespecie se caracteriza por presentar la subocular en contacto con el labio entre otros caracteres. El este de la Península y sur de Francia están habitados por la subsp. *Ps. b. edwardsianus*.



Distribución de *Psammodromus hispanicus*