

Inv. Nr. Z 1576

ТРУДЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАГО
ОБЩЕСТВА
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ,

ИЗДАВАЕМЫЕ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ЧЛЕНА СОВѢТА ОБЩЕСТВА

А. Бекетова.

ТОМЪ VIII.

ПРИЛОЖЕНІЕ. = *Beilage, Supplement*

Путешествіе по Закавказскому краю въ 1875 году
съ зоологическою цѣлью.

В. КЕССЛЕРА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 2 л., 7.

1878

Кавказа, частью по сую сторону главнаго Кавказскаго хребта (въ Кубанской области, въ Пятигорскѣ, въ долинѣ рѣки Бѣлой, до станицы Даховской), частью по ту сторону его (въ долинѣ Арагвы, преимущественно около станціи Анануръ). Дальнѣйшее же распространеніе вида *L. praticola* остается пока неизвѣстнымъ.

L. praticola какъ по образованію спинныхъ чешуекъ, такъ по числу бедражныхъ железокъ и по очень постепенному утонченію хвоста напоминаетъ о *L. vivipara* L., но въ цѣлости все таки ближе подходитъ къ *L. muralis*, нежели къ *L. vivipara*, особенно къ разности *L. muralis*, называемой *L. saxicola*.

Примѣчаніе. Эверсманъ, когда составлялъ описаніе вида *L. praticola*, имѣлъ въ рукахъ только одинъ экземпляръ этой ящерицы, пойманный имъ около ключа Нарзана. У сказаннаго экземпляра междутемяной щитикъ поперечною насѣчкою былъ раздѣленъ на двѣ части, бѣльшую, переднюю и меньшую, заднюю, какъ показываетъ и рисунокъ Эверсмана. Это раздѣленіе междутемянаго щитика авторъ готовъ былъ принять за нормальное и даже включилъ его въ число отличительныхъ признаковъ *L. praticola*. А между тѣмъ раздѣленіе это совершенно случайное и встрѣчается изрѣдка также у другихъ ящерицъ. Изъ 13 экземпляровъ *L. praticola*, бывшихъ у меня въ рукахъ, ни одинъ не представлялъ подобнаго раздвоенія междутемянаго щитика.

Видъ. 5. *Lacerta Pertschinskii*, sp. nova.

Lacerta Pertschinskii: capite parvo, depresso-fusiforini, cauda rotundata, longissima; scutella occipitalia parva duo scutello interparietali postposita; scutellum nasofrenale angustatum unicum; scutellarum gularium paria sex, quorum tria anteriora inter se contingentia; tempora granosa scutoque masseterico, integro vel bipartito, distincto; collare vix arcuatum, integrum, scutellis 12 obsitum; squamae dorsales graniformes, laeves; squamae caudales carinatae, in annulos 115 dispositae; scutella abdominalia per series sex disposita; pori femorales 20|22. Longitudo 115 mm. (longitudo corporis 46 mm., caudae 101 mm.).

Отличительные признаки. Небольшая голова и веретенообразное туловище очень замѣтно приплющены, а круглый хвостъ длиннѣе тѣла слишкомъ въ два раза; позади довольно большаго, продолговатаго, къ заднему концу немного суженнаго, междутемянаго щитика сидятъ два небольшіе щитика

затылочные; находится только одинъ узенькій щитикъ скулоносовый; находится шесть паръ горловыхъ щитиковъ, изъ которыхъ передніе три въ средней линіи между собою соприкасаются, а самые задніе почти достигаютъ нижняго края барабанныхъ отверстій; виски покрыты мелкими, почти зерновидными чешуйками, окружающими небольшую центральную пластинку, иногда раздвоенную; ошейникъ почти прямой и содержитъ 12 пластинокъ, плотно между собою смыкающихся; вся спина покрыта мелкими, гладкими, зерновидными чешуйками; продолговатая, реброносная хвостовая чешуйка образуетъ до 115 правильныхъ колець; брюшныя пластинки расположены въ шесть рядовъ; бедряныхъ железокъ находится 20|22.

Описание. Ящерица эта уже на первый взглядъ отличается отъ всѣхъ другихъ своею небольшою, сильно приплюсненною головою, своимъ веретенообразнымъ, сильно приплюсненнымъ туловищемъ и своимъ чрезвычайно длиннымъ хвостомъ.

Длина головы, впереди значительно суженной и заостренной, содержитсяъ въ длинѣ тѣла (безъ хвоста) слишкомъ $4\frac{1}{2}$ разъ; высота головы составляетъ около $\frac{2}{5}$, а ширина около $\frac{2}{3}$ ея длины. Ширина лба между глазами, нѣсколько меньше $\frac{1}{2}$ длины головы. Продольный діаметръ глаза составляетъ около $\frac{2}{7}$ длины головы, а разстояніе отъ вершины рыла до передняго угла глаза приблизительно равняется разстоянію отъ задняго угла глаза до передняго края барабаннаго отверстия. Нижнее вѣко по краямъ покрыто зерновидными чешуйками, а по середивѣ мельчайшими табличками.

Междутемяной щитикъ довольно великъ и именно ширина передней части его равняется ширинѣ задней части лобнаго щитика. Къ заднему концу его примыкаютъ два затылочные щитика. Скулоносовый щитикъ очень узенькій. Изъ семи верхнегубныхъ щитиковъ каждаго бока пятый приходится подъ глазомъ, служитъ подглазнымъ щитикомъ, а седьмой весьма малъ. Очень удлиненныхъ и узенькихъ нижнегубныхъ щитиковъ съ каждаго бока можно отличить шесть. Изъ шести паръ горловыхъ щитиковъ три переднія вполнѣ сходятся между собою въ средней линіи. Виски покрыты немного выпуклыми, мелкими чешуйками, расположенными кругомъ одной централь-

ной пластинки (на лѣвомъ вискѣ центральная пластинка простая, овальная, на правомъ вискѣ она раздвоена); продолговатая, довольно большая пластиночка также окаймляетъ собою верхнюю часть широкаго барабаннаго отверстія. Отъ глаза височныя чешуйки отдѣляются тремя небольшими, кругловатыми пластиночками, отъ темянаго щитика 4 или 5, болѣе или менѣе продолговатыми, пластиночками. Бровяные щитики отъ узенькихъ надглазныхъ отдѣляются рядомъ мельчайшихъ зернышекъ.

Поперечная горловая бороздка, проходящая отъ одного барабаннаго отверстія до другаго, малопримѣтна, хотя и обозначается двумя, несовсѣмъ правильными рядами мельчайшихъ, зерновидныхъ чешуекъ. Позади горловой бороздки, особенно ближе къ ошейнику, чешуйки постепенно дѣлаются все болѣе и болѣе крупными. Самый ошейникъ имѣетъ форму весьма плоской дуги и состоитъ изъ 12 пластиночекъ, изъ которыхъ средвія значительно крупнѣе боковыхъ; притомъ же всѣ пластиночки смыкаются между собою въ неразрывный рядъ, не образуютъ выдающихся зубчиковъ.

Позади головы, до половины промежутка, отдѣляющаго голову отъ переднихъ ногъ, туловище примѣтно суживается, образуя такимъ образомъ примѣтную шейку.

Вся верхняя сторона туловища покрыта очень мелкими, выпукло-зерновидными чешуйками, расположенными въ болѣе или менѣе правильные, поперечные ряды; брюхо же покрыто четырехугольными пластинками, образующими до 30 поперечныхъ и 6 продольныхъ рядовъ; существуютъ, кромѣ того, съ каждаго бока зачаточныя пластиночки брюхобоковыя. На каждый поперечный рядъ брюшныхъ пластинокъ приходится отъ 3 до 4 рядовъ спинныхъ чешуекъ. Въ каждомъ изъ поперечныхъ спинныхъ рядовъ, взятомъ по серединѣ туловища, можно насчитать около 56 отдѣльныхъ чешуекъ. Только на самыхъ заднихъ спинныхъ чешуйкахъ начинаетъ обозначаться едва примѣтное продольное ребрышко. Продолговатая хвостовая чешуйка снабжена возвышеннымъ, продольнымъ ребрышкомъ, въ особенности на верхней сторонѣ хвоста, и образуютъ собою до 115 правильныхъ колець. На основпой части хвоста нахо-

дится, въ средней линіи спиннаго хребта, небольшою жолобокъ, по менѣе глубокой, нежели у *L. muralis*. Передній край заднепроходной щели окаймляется большою, широкою пластинкою, окруженною съ боковъ и спереди рядомъ меньшихъ пластинокъ. Бедряныхъ железокъ находится съ правой стороны 20, съ лѣвой 22.

Переднія ноги, протянутыя впередъ, достаютъ почти до вершины головы, а заднія почти до плеча переднихъ; вообще длина каждой передней ноги составляетъ почти $\frac{2}{3}$ длины задней ноги, которая едва только меньше, нежели разстояніе отъ передней ноги до задней. На переднихъ ногахъ плечевая часть покрыта съ передней стороны 4 большими пластинками, а на заднихъ ногахъ бедряная часть 6 большими пластинками.

Цвѣтъ верхней стороны тѣла, на спиртовомъ экземплярѣ, голубовато-сѣрый, нижней стороны тѣла свѣтло-голубоватый. На верхней сторонѣ головы и туловища замѣчаются, сверхъ того, черноватая и бѣловатая крапинки, первая ближе къ срединѣ спины, а послѣдняя по бокамъ шеи и туловища. Черноватая крапинка находится также на передней сторонѣ переднихъ ногъ, а бѣловатая пятнышка на задней сторонѣ заднихъ ногъ.

Единственный экземпляръ этого замѣчательнаго вида ящерицы добытъ, І. А. Порчинскимъ, въ окрестностяхъ Тифлиса и имѣетъ въ длину 147 мм., изъ которыхъ 101 мм. приходится на хвостъ.

Наиближе, конечно, видъ этотъ подходитъ къ виду *L. muralis*, но отличается отъ этого послѣдняго уже на первый взглядъ, не говоря о цвѣтѣ, своимъ болѣе тонкимъ и сильнѣе приплюснутымъ тѣломъ и своимъ болѣе длиннымъ хвостомъ.

Видъ 6. *Lacerta taurica* Pall.

Палласъ, Ратке, Нордманъ, Вагнеръ, Де-Филиппи.

Таврическая ящерица, впервые описанная Палласомъ, составляетъ дѣйствительно, какъ мнѣ кажется, самостоятельный видъ, хотя и очень близко подходящій къ виду *L. muralis*. Сообщу здѣсь нѣкоторыя замѣтки на счетъ отличительныхъ признаковъ этой ящерицы, основанныя на разсмотрѣніи выше