

Reptilia.

Homopus Horsfieldii Gray. Ташъ-бака (адерб.), Дак-пештъ (фарс.).

Найдена въ пескахъ окрестностей Чигишляра.

Emys europaea Schneid.

Въ низовьяхъ Гюргеня эта черепаха живетъ во множествѣ.

Tropidonotus natrix var. *persa* Pall.

Н. А. Зарудный добылъ этого ужа близъ Астрабада. Высоко въ горахъ близъ Алястана этотъ видъ замѣченъ въ значительномъ количествѣ въ ямахъ, наполненныхъ стоячей водой.

Zamenis Karelini Bdt.

Добыта подъ Красноводскомъ.

Zamenis Fedtschenkoï Str. Моръ (фарс.).

Найдена близъ Келяте-Хыча.

Trigonocephalus halys Pall.

Эту змѣю Н. А. Зарудный убилъ у Чигишляра. Въ коллекціи нѣтъ.

Naja oxiana Eichw.

Мнѣ удалось убить эту рѣдкую змѣю въ пещерѣ, не доѣзжая русскаго поста Гармаба (близъ Геокъ-тепе). Экземпляръ достигаетъ болѣе двухъ аршинъ длины. Змѣя чрезвычайно смѣла и при моемъ приближеніи не думала уходить. Будучи подстрѣлена, она расширяла свои переднія ребра, такъ что въ этомъ мѣстѣ получалось вздутіе, но значительно меньшихъ размѣровъ, нежели у обыкновенной очковой змѣи ¹⁾. Питается, по словамъ персіанъ, кикиликами (*Perdix chukar*), которыхъ

¹⁾ Живую очковую змѣю мнѣ привелось видѣть на островѣ Цейлонѣ, при возвращеніи съ Сахалина.

подстерегаетъ въ скалахъ. По словамъ казаковъ поста Гармаба, собака, укушенная ею, умираетъ не болѣе какъ чрезъ 5 минутъ. Вся верхняя часть змѣи ровнаго темно-аспиднаго цвѣта безъ всякихъ узоровъ. Нижняя часть значительно свѣтлѣе. Экземпляръ отданъ въ музей Академіи Наукъ.

Pseudopus Pallasii Cuv.

Въ низовьяхъ Гюргеня эта змѣевидная ящерица очень обыкновенна и отсюда взятъ экземпляръ нашей коллекціи.

Anguis fragilis L.

Найдена близъ Абера.

Varanus scincus Merr.

По разспроснымъ свѣдѣніямъ, эта огромная ящерица, называемая русскимъ крокодиломъ, встрѣчается иногда въ окрестностяхъ Чигишляра.

Lacerta muralis Merr.

Найдена близъ Акъ-Калы.

Lacerta stirpium Daud. Мярсу (адерб.).

Добыта въ устьѣ Гюргеня и близъ Акъ-калы. Въ послѣднемъ пунктѣ она очень обыкновенна. Спина травяно-зеленаго цвѣта.

Eremias velox Pall.

Въ окрестностяхъ Чигишляра встрѣчается въ значительномъ количествѣ.

Eremias Strauchi Kessler.

Добытъ близъ Абера.

Agama sanguinolenta Eichw.

Обыкновенна въ окрестностяхъ Чигишляра, добыта также близъ Баши. Придерживается твердой глинистой почвы.

Megalochilus auritus Pall.

Въ пескахъ окрестностей Чигишлара очень обыкновенна.

Phrynoscephalus helioscopus Pall.

Многочисленна въ окрестностяхъ Чигишлара, найдена также близъ Нардына. Придерживается твердой глинистой почвы.

Phrynoscephalus interscapularis Licht.

Весьма многочисленна въ пескахъ окрестностей Чигишлара. Въ количественномъ отношеніи она преобладаетъ здѣсь надъ всѣми другими ящерицами. По песчанымъ склонамъ бархановъ всюду видѣются закорюченные съ яркими красными и черными поперечными полосами хвосты самцовъ, которыми они, вѣроятно, привлекаютъ самокъ. При преслѣдованіи они быстро зарываются въ песокъ, на которомъ не остается почти никакихъ слѣдовъ. Пользуясь этой привычкой, мы безъ труда ловили этихъ ящерицъ. Стоило только нѣсколько побѣгать за животнымъ, какъ оно уже пряталось въ песокъ, откуда мы вытаскивали его безъ всякихъ хлопотъ.

Stellio caucasicus Eichw. Кялбаса (адерб.), Кяртанкала (фарс.), Пашлякъ (туркм.).

Эта горная ящерица впервые замѣчена по дорогѣ къ Алястану. Всюду въ горахъ пройденной нами части Персіи и Закаспійской области она очень многочисленна. Поднимается до верхней границы лѣса. Предпочитаетъ скалы, гдѣ прячется между камнями; поэтому живьемъ ее добыть очень трудно, настрѣлять же изъ ружья можно сотни экземпляровъ; это тѣмъ болѣе удобно, что мелкая дробь при большихъ размѣрахъ этой ящерицы не приноситъ ей большихъ поврежденій. Любитъ также глиняные заборы садовъ и ауловъ, гдѣ прячется въ трещинахъ или норахъ. При быстромъ движеніи она выпрямляетъ ноги такимъ образомъ, что все туловище высоко приподнимается отъ земли.

Gymnodactylus caspius Eichw.

Близъ Акъ-калы въ искусственно вырытыхъ ямахъ эти ящерицы держатся во множествѣ. Здѣсь удалось намъ наловить ихъ до 50 экземпляровъ. Добыта также въ Красноводскѣ.

Ablepharus deserti Str.

Добыта въ горахъ на высотѣ до 7,000 ф. по дорогѣ отъ Алястана на Аберъ на южной сторонѣ перевала. Здѣсь онѣ довольно обыкновенны и достигаютъ крупныхъ размѣровъ. Въ глинистой пустынѣ въ окрестностяхъ Джоджерма добыты нѣсколько очень мелкихъ экземпляровъ.

Euprepis princeps Eichw.

Найдена близъ аула Абера.

Amphibia.*Rana esculenta* L. Вазахъ (фарс.).

Эти лягушки встрѣчаются въ незначительномъ количествѣ въ устьѣ Гюргеня.

Hyla arborea L.

Квакушка найдена въ болотѣ между Акъ-калой и Науканомъ.

Bufo viridis Laur. Моунъ (туркм.).

Найдена въ низовьяхъ Гюргеня. Замѣчена также въ Келяте-Хычѣ.