



*Lacerta agilis*. Cadí, Barcelona (Fèlix Amat).

*Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758)

Lagarto ágil, Lagarto ágil


Llangardaix pirinenc (C)

Este lagarto se distribuye por la mayor parte de Europa y Asia Central llegando a China, Mongolia y el Lago Baikal. En Europa, sus límites son los Pirineos, el Cáucaso, el sur de la península Escandinava, los Alpes Italianos y el norte de Grecia. Se encuentran poblaciones aisladas en el sur y noroeste de Inglaterra.

En la Península Ibérica sólo se encuentra en Andorra y las comarcas de la Cerdanya y el Ripollés en el Pirineo Catalán. En esta última sólo se han conseguido las citas comprobadas. Esta distribución resulta más restringida de lo previamente supuesto en la bibliografía.

La aparente continuidad en el área de distribución encubre una realidad distinta, ya que las poblaciones ibéricas de este saurio son muy discontinuas y sin contacto en todos los casos. Esto es una característica propia de las poblaciones periféricas del área de una especie, en este caso, poblaciones en el límite meridional en Europa, y cabría aventurar la hipótesis de que son de colonización muy reciente (Pleistoceno tardío). Su ausencia en otras zonas pirenaicas puede ser debida a este último factor.

En su distribución ibérica, el rango altitudinal oscila entre 1400 y 2200 m. Todas las poblaciones ibéricas se hallan en una región caracterizada por presentar una temperatura media anual inferior a 9° C y una pluviosidad superior a los 1000 mm anuales.



*Lacerta agilis.*

El Lagarto ágil se localiza en zonas de bosque aclarado como pinares de pino albar y negral así como en abetales con abundante vegetación herbácea y arbustiva. También se halla en prados alpinos, a menudo en zonas de turbera o con abundante agua encharcada, típica de fondos de valle. Cabe destacar que, en su distribución europea, los biotopos ocupados por este saurio son mucho más amplios. Los ejemplares de esta especie pueden ser observados frecuentemente entre la vegetación herbácea, la cual aprovechan para esconderse y asolearse. También pueden hallarse en márgenes de caminos y pistas bien orientados.

Las poblaciones pirenaicas del Lagarto ágil pueden presentar en ocasiones densidades altas, aunque restringidas a áreas bastante reducidas. La población pirenaica ha sido descrita como *L. a. garzoni*.

Referencias más significativas: Bischoff (1984), Castanet (1989), Llorente *et al.* (1995), Palacios & Castroviejo (1975).

*Gustavo A. Llorente, Xavier Santos, Miguel A. Carretero y Albert Montori*