

BOLETIN

DE LA ASOCIACION HERPETOLOGICA ESPAÑOLA

n.º 15 (2) - diciembre 2004



NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA LAGARTIJA BATUECA: *Iberolacerta martinezricai*

OSCAR J. ARRIBAS

Avda. Fco. Cambó 23. 08003 Barcelona. España
e-mail: oarribas@pie.xtec.es

Hasta la fecha se pensaba que la especie habitaba sólo la cumbre de la Peña de Francia (de 1600 a 1723 m aproximadamente), ocupada desde antiguo por un monasterio y una creciente representación de infraestructuras turísticas que probablemente son las responsables de que la población, ya de por sí escasa, se encuentre cada vez más amenazada (Pérez Mellado, 1993. *Salamanca, Revista Provincial de Estudios*, 9-10: 9-78; Arribas, 1996. *Herpetozoa, Wien* 9: 31-56; Arribas, 1999. *Herpetozoa, Wien* 12: 119-128). Igualmente, se encuentra presente en el cercano pico del Hastiala (1730 m).

En 2001, Vincent Joubert y Françoise Gilles fotografiaron en la zona de las Batuecas y nos remitieron para su identificación un saurio del que pensaron que debía de tratarse por sus características de esta especie y que efectivamente resultó ser claramente una lagartija como las de la cercana pero mucho más alta Peña de Francia

(Arribas det.). El ejemplar fue fotografiado cerca del Puerto del Portillo a un altura muy inferior a la que se consideraba como propia del taxon: de 1200 a 1300 m.

Cuatro prospecciones estivales (2001-2002) en la zona han revelado la existencia de poblaciones localizadas pero numerosas en toda la zona del Puerto del Portillo (La Alberca, Salamanca), y no sólo a esta altura, sino que se puede decir que esta lagartija es abundante entre los 1400 y los 1000 m, y descendiendo, al menos hasta 840 m en el valle de las Batuecas.

Por otro lado, está presente en la cara norte de la Sierra de las Mestas (cuyo punto culminal, el pico Rongiero alcanza 1627 m en su cumbre), al menos de 800 a 1400 m, desde la zona del Pico de los Robledos y el Desierto de San José hacia el Collado de Valleverde y más al oeste. Muy probablemente habite también en la vertiente sur, perteneciente ya a la Comunidad Extremeña.

Así, el área conocida queda incluida en un polígono formado por la Peña de Francia-Hastiala-Rongiero y Peña Orconera, extendiéndose muy probablemente más al oeste, hacia la Sierra de Gata. Toda esta area es, no obstante muy pequeña y no cubre mas que dos cuadrículas UTM 10x10 (29TQE48; 29TQE38).

En todas estas zonas habita en el Piso Mesomediterráneo (piso de la encina-carrasca), alcanzando en los puntos más altos la zona inferior del Piso Supramediterráneo (piso del roble melojo). En toda esta zona habita en canchales de blo-



Figura 1. Puerto del Portillo (Salamanca).

ques grandes que se extienden por las laderas entre melojares en las partes más altas y encinares con alcornoques en las medias y bajas, con temperaturas estivales que alcanzan frecuentemente los 40 °C a la sombra, muy distintas a las temperaturas moderadas de la alta montaña de Guadarrama, Gredos, Bejar o Estrella, incluso en pleno verano.

Su área de distribución es de tipo relíctico, lo que hace de ella la única lagartija de este grupo que habita en hábitats totalmente mediterráneos y hasta alturas bastante bajas.

La población culminal (Peña de Francia)

es simpátrica y sitópica con *Podarcis* gr. *hispanica*, *Lacerta lepida* y *Coronella austriaca* (obs. propias). Las de altitudes bajas lo son con *Podarcis* gr. *hispanica*, *Psammodromus algirus*, *Lacerta lepida*, *Chalcides bedriagai pistaciae* y *Vipera latastei*.

A la luz de estos nuevos hallazgos sobre su ecología y hábitat, es muy probable que habite también otros puntos más al oeste, hacia la Sierra de Gata, donde la especie fue buscada infructuosamente en las zonas más altas o descartada su presencia por la falta de estos ambientes, pero bajo supuestos de hábitat muy distintos a los que parece ocupar en realidad.