

Inv. Nr. Z 1576

ТРУДЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАГО
ОБЩЕСТВА
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ,

ИЗДАВАЕМЫЕ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ЧЛЕНА СОВѢТА ОБЩЕСТВА


А. Бекетова.

ТОМЪ VIII.

ПРИЛОЖЕНИЕ. = *Beilage, Supplement*

Путешествіе по Закавказскому краю въ 1875 году
съ зоологическою цѣлью.

К. КЕССЛЕРА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 2 л., 7.

1878

L. Portschini хвостовыя чешуйки снабжены весьма примѣтнымъ, сильно развитымъ, возвышеннымъ ребрышкомъ, тогда какъ у *L. oxycephalata* ребрышко хвостовыхъ чешуекъ мало развито, мало примѣтно.

Родъ II. *Eremias* Wagler.

Видъ 8. *Eremias velox* Pali.

Lacerta velox Pali., *Lacerta variabilis* Pali. (ex parte), *Lacerta vittata* Eversm., *Podarcis velox* Ménétr., *Aspidorhinus gracilis* Eichw.

Палласъ, Менетриэ, Эверсманъ, Эйхвальдъ, Бланфордъ.

Водится въ степяхъ прикаспійскихъ (начиная съ Астрахани) и приаральскихъ, но неизвѣстно, встрѣчается ли гдѣ либо по правую сторону отъ рѣки Волги. Въ Закавказскомъ краѣ была находима въ окрестностяхъ Баку, въ степяхъ Елисаветпольской и Эриванской. Попадается, какъ кажется, и въ сѣверныхъ частяхъ Персіи.

Въ Зоологическомъ кабинетѣ Петербургскаго университета имѣются экземпляры изъ Баку (О. А. Гриммъ), изъ окрестностей Елисаветполя и Эчміадзина (І. А. Порчинскій). Между послѣдними находятся молодые, вполне подходящіе къ рисункамъ Эверсмана и Эйхвальда (*Lac. vittata*, *Aspidorh. gracilis*). У болѣе взрослыхъ экземпляровъ изъ той же мѣстности также еще сохраняются 6 продольныхъ бѣлыхъ полосоѡъ, но основной цвѣтъ спины уже не черный, а сѣроватобурый. Одинъ экземпляръ отличается шишковиднымъ отросткомъ на основной части хвоста (съ правой стороны).

Видъ 9. *Eremias Strauchi*, nov. spec.

Видъ этотъ открытъ І. А. Порчинскимъ въ степи Эриванской и именно въ окрестностяхъ Эчміадзина; дальнѣйшее же распространеніе его остается пока неизвѣстнымъ.

Помѣщаю здѣсь подробное описаніе этой ящурки.

Eremias Strauchi: capite parvo, trunco fusiformi, cauda longa; scutello internasali simplici, non diviso, frontonasalibus tribus, medio parvo, angusto, suboculari utrinque inter duo scutella supralabialia (inter quintum et septimum) posito, marginem oris attingente; collari libero, leviter arcuato, scutellis

parvis 8—11 obsito; scutellis abdominalibus parvis in 30—32 series transversas et 16 obliquas, angulo acuto retrorsum spectanti convergentes, dispositis; poris femoralibus utrinque 18—20; scutellis tibialibus externae seriei magnis, transverse valde dilatatis, cetera latitudine quintuplo superantibus; squamis caudalibus elongatis, vix carinatis, in annulos 100—108 dispositis.

Supra livido-cinerea, subtus albicans unicolor. Capite supra fuscocinereo cum regione utraque temporali nigro-maculata; dorso duabus fasciis nigris longitudinalibus, utrinque albo limbatis, interdum interruptis, ornato, lateribus nec non cauda nigro et albo maculatis et fasciatis.

Longitudo 160 mm.

Отличительные признаки. Удлиненный подглазной щитокъ своею суженною нижнею частью вдается между щитками верхнегубными и доходить до края верхней челюсти, такъ что совершенно вдвигается въ рядъ верхнегубныхъ щитковъ, есть именно какъ бы шестой верхнегубной щитокъ; лобносовыхъ щитковъ находится три, хотя средній изъ нихъ и бываетъ очень не великъ; чешуйки, покрывающія верхнюю сторону тѣла, почти зерновидны и ихъ находится, по срединѣ туловища, около 60 въ каждомъ поперечномъ ряду; брюшныя пластинки образуютъ 16 продольныхъ рядовъ и отъ 30 до 32 поперечныхъ рядовъ; хвостовыя чешуйки, изъ которыхъ верхнія снабжены малопримѣтнымъ продольнымъ ребрышкомъ, образуютъ, когда хвостъ совершенно полный, до 108 колець; бедряныхъ железокъ находится съ каждаго боку отъ 18 до 20. Цвѣтъ тѣла голубаватосѣрый и спина опоясана двумя, то сплошными, то прерывистыми черными полосками, окаймленными съ обѣихъ сторонъ бѣлыми черточками; бока туловища испещрены черными и бѣлыми пятнышками и полосками.

Описаніе. Ящурка эта по тѣлосложенію очень сходна съ *E. velox* и относится дѣйствительно къ тому же отдѣлу рода *Eremias*, для котораго видъ *E. velox* служитъ типомъ, но отличается отъ другихъ видовъ означеннаго отдѣла тѣмъ, что у ней находятся три лобносовые щитика; только видъ *E. multio-*

cellata Günth. изъ того же отдѣла ящурокъ въ этомъ отноше-
шеніи съ нею сходенъ.

Стройное, веретенообразное тѣло оканчивается довольно длиннымъ хвостомъ; а именно длина хвоста больше длины тѣла слишкомъ въ $1\frac{2}{3}$ разъ. Длина головы составляетъ около $\frac{1}{4}$ длины тѣла (безъ хвоста); вышина головы составляетъ почти $\frac{1}{2}$ ея длины и примѣтно меньше ея ширины. Продольный діаметръ глаза содержится въ длинѣ головы около 5 разъ и приблизительно равняется поперечному діаметру барабаннаго отверстія. Ширина лба между глазами составляетъ едва только меньше $\frac{1}{2}$ длины головы; къ переднему концу рыло очень значительно суживается. Разстояніе отъ вершины рыла до передняго края глаза равняется разстоянію отъ задняго края глаза до задняго края барабаннаго отверстія.

Щитики, покрывающіе верхнюю сторону головы, болѣе или менѣе выпуклы; только лобный щитикъ, который къ переднему концу весьма сильно суженъ (поперечникъ задней его части въ 3 раза меньше поперечника передней части), содержитъ при переднемъ концѣ болѣе или менѣе замѣтную, продольную бороздку. Изъ трехъ лобносовыхъ щитиковъ средній, продолговато-треугольный, весьма не великъ, несравненно меньше двухъ боковыхъ. Ромбоидальный междутемянной щитикъ также очень малъ. Подглазной щитикъ книзу очень значительно суживается и совершенно вдвигается между верхнегубными щитиками, доходя до края верхней челюсти; онъ составляетъ какъ бы шестой щитикъ верхнегубной (у *E. velox* седьмой); три верхнегубные щитика, лежащіе позади подглазнаго, весьма малы, особенно задніе. Нижнегубныхъ щитиковъ можно отличить 6 или 7, изъ которыхъ 5-ый и 6-ой приходятся подъ подглазнымъ щитикомъ. Вѣка вполнѣ усажены зернистыми чешуйками. Виски покрыты мелкими, кругловатыми, выпуклыми чешуйками; только къ подглазному щитику примыкаютъ двѣ болѣе крупныя, выпуклыя пластиночки, облегающія съ задней стороны орбиту, и находится одна удлиненная, выпуклая пластиночка при верхнемъ краѣ барабаннаго отверстія. Снизу голова отдѣляется отъ шеи болѣе или менѣе примѣтною, поперечною бороздкою, проходящею отъ одного ба-

рабаннаго отверстія до другаго; чешуйки, лежащія въ этой бороздкѣ, едва только меньше, нежели смежныя съ ними горловые и шейныя. Горловые чешуйки, занимающія пространство отъ горловыхъ щитиковъ до шейной бороздки, болѣе или менѣе продолговаты, особенно самыя переднія изъ нихъ, а чешуйки, занимающія промежутокъ между шейною бороздкою и ошейникомъ, кругловаты, или нѣсколько вытянуты въ поперечномъ направленіи. Горловыхъ щитиковъ находится 5 паръ, изъ которыхъ три переднія въ средней линіи между собою соприкасаются. Ошейникъ бываетъ свободный, плоско дуговидный, и содержитъ по срединѣ отъ 8 до 11, болѣе или менѣе широкихъ пластинокъ, не образующихъ выдающихся зубцовъ, а довольно плотно между собою смыкающихся.

Все туловище покрыто съ верхней стороны очень мелкими, почти зерновидными, ромбоидальными, нѣсколько выпуклыми чешуйками, расположенными въ продольные и поперечные ряды. По срединѣ туловища въ каждомъ поперечномъ ряду можно насчитать отъ 58 до 62 чешуекъ. Брюхо покрыто ромбоидальными, плоскими пластиночками, расположенными въ правильные поперечные и косые продольные ряды; продольныхъ рядовъ брюшныхъ пластинокъ находится 16, а поперечныхъ рядовъ отъ 30 до 32. На каждый поперечный рядъ брюшныхъ пластинокъ приходится два, или чаще три ряда спинныхъ чешуекъ.

Хвостъ къ заднему концу довольно *быстро утончается и къ вершинѣ дѣлается нитеобразнымъ; покрывающія его пластиночки болѣе или менѣе продолговаты и расположены правильными кольцами, которыхъ число простирается отъ 100 до 108 (когда хвостъ совершенно полный). Верхнія хвостовыя пластиночки бываютъ снабжены болѣе или менѣе примѣтнымъ продольнымъ ребрышкомъ, а нижнія совершенно гладки.

Разстояніе отъ каждой передней ноги до соотвѣтственной задней ноги составляетъ иногда почти $\frac{1}{2}$ длины всего тѣла (безъ хвоста), а иногда примѣтно меньше. Длина каждой задней ноги, отъ ея основанія до вершины втораго пальца, всегда нѣсколько больше $\frac{1}{2}$ длины тѣла, а длина каждой передней ноги составляетъ $\frac{2}{3}$ длины задней ноги.

Передній край заднепроходной щели унизанъ весьма мелкими чешуйками, только середину его иногда занимаетъ одна, болѣе широкая, шестиугольная пластиночка. Бедряныхъ железокъ находится отъ 18 до 20 (а именно у одного изъ трехъ экземпляровъ, бывшихъ у меня на разсмотрѣніи, находилось 19|18 бедряныхъ железокъ, у другаго 19|19, у третьяго 20|19).

Пластиночки, занимающія переднюю сторону каждаго бедра, весьма широки, такъ что поперечный діаметръ ихъ по крайней мѣрѣ въ 5 разъ больше, нежели діаметръ чешуекъ, наполняющихъ промежутокъ между означенными пластиночками и бедряными железками. Равняются сказаннымъ пластиночкамъ по величинѣ пластиночки (числомъ 4—5), занимающія нижне-переднюю сторону голени. По нижней сторонѣ пальцевъ, какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ ногахъ, проходитъ возвышенное ребрышко.

Основной цвѣтъ верхней стороны тѣла голубовато-сѣрый, вся нижняя сторона тѣла и хвоста желтоватобѣлая. Голова сверху и особенно съ боковъ испещрена темнобурими пятнышками и полосками. Начиная отъ затылка до хвоста, по бокамъ спины тянутся двѣ довольно широкія черныя полосы, то сплошныя, то прерывчатыя, которыя съ обѣихъ сторонъ (сверху и снизу) окаймлены бѣлыми черточками. Самая середина спины то бываетъ одноцвѣтная, то замѣчаются на ней, особенно ближе къ головѣ, еще двѣ промежуточныя бѣловатая полосы, которыя* дальше назадъ между собою сливаются. Бока туловища иногда бываютъ испещрены бѣлыми пятнышками съ чернымъ ободкомъ, иногда же черноватыми пятнышками и бѣловатыми черточками и полосками.

Изъ трехъ экземпляровъ, доставленныхъ мнѣ г. Порчинскимъ, самый большой имѣлъ въ длину 160 мм. (тѣло 60 мм., хвостъ 100 мм.).

Названъ мною видъ *E. Strauchi*, по имени академика А. А. Штрауха, такъ превосходно описавшаго почти всѣ извѣстные виды рода *Eremias*.

Видъ 10. *Eremias arguta* Pall.

Lacerta arguta Pall., *Lacerta variabilis* Pali., *Lacerta*