

come in Sardegna troviamo una forma un po' modificata di una specie (*L. taurica*) che mancando pure all'Italia peninsulare, si trova in Grecia.

A mio avviso l'*Oxycephala* di Corsica merita di essere distinta con un nome almeno di sottospecie; perciò io propongo di indicarla col nome di *Lacerta oxycephala* DUM. et BIBR. sub sp. BEDRIAGA, dedicando questa sottospecie al Dott. I. Bedriaga.

Lacerta oxycephala DUM. et BIBR. sub. sp. BEDRIAGAE.

Frequentemente una sola nasofrenale; regione masseterica granulosa e senza disco masseterico; zampe anteriori che ripiegate lungo il capo arrivano fino alle narici; collo un po' più grosso; capo meno acuminato; mole un po' maggiore che nella forma tipica.

Habit. Corsica.

DIMENSIONI.

	DALMAZIA		CORSICA	CORSICA	DALMAZIA	CORSICA (?)
	♂	♀	♀	(1)	(2)	(3)
Lungh. totale	0,150	—	0,160	0,226	0,190	pollici 8 e linee 0
» del capo	0,015	0,014	0,015	0,022	—	» 0 » 10
» del tronco	0,042	0,045	0,050	0,056	—	» ⁽⁴⁾ 1 » 7
» della coda	0,093	—	0,095	0,140	0,110	» 5 » 0
» delle estremità anteriori	0,019	0,018	0,023	—	—	» 1 » 2
» » posteriori	0,029	0,030	0,036	—	—	» 1 » 9
Larghezza massima del capo	0,009	0,008	0,010	—	—	—
Altezza id.	0,006	0,006	0,006	—	—	—
Diametro minimo del collo	0,008	0,007	0,010	—	—	—

Rispetto alla distribuzione geografica di questa forma in Corsica e rispetto alle sue colorazioni e macchiettature, essendo gli esemplari da me esaminati scoloriti, rimando il lettore al lavoro ripetutamente citato del Bedriaga dove queste particolarità sono minutamente trattate.

- (1) Da BEDRIAGA, op. cit.
 (2) DE BETTA, *Fauna ital.*
 (3) BONAPARTE, *Iconogr. Fauna Ital.*
 (4) Senza il collo, che misura sette linee.

