


*Lacerta vivipara* JACQUIN, 1787. Lagartija de turbera.

*DESCRIPCION.* Cabeza relativamente pequeña. La rostral

no contacta con la cavidad nasal. Normalmente hay una postnasal y una loreal. Cuatro supralabiales anteriores a la subocular. No hay gránulos entre las supraoculares y las supraciliares. Occipital pequeño. Temporal con masetérica y timpánica distintas. Pliegue gular ausente. 14 a 21 escamas gulares. Collar de borde aserrado, formado por 7 a 9 escamas. Escamas dorsales hexagonales en número de 26 a 37 en el centro del cuerpo. Seis series longitudinales y 24 a 30 series transversales ventrales. Generalmente dos semicírculos de escamas rodean la preanal. 7 a 13 poros femorales a cada lado. Dorso de color marrón con una línea vertebral de puntos oscuros. En los costados hay una banda más oscura con el borde interno bien definido. Los machos tienen el vientre de color naranja ampliamente moteado de negro, mientras que las hembras son amarillentas y sin manchas. Los recién nacidos son casi negros.


*LONGITUD TOTAL.* Hasta 180 mm.

*BIOLOGIA.* Esta lagartija vive preferentemente en los prados muy húmedos, turberas y zonas próximas a los lagos de alta montaña. En estas zonas sus períodos de actividad anual son



muy cortos y comienzan incluso antes de que se hayan fundido las últimas nieves. Como adaptación al medio en que vive, la lagartija de turbera no duda en arrojarse a las heladas aguas de las charcas, sin que por ello vea disminuida su vitalidad. Como en la alta montaña la temperatura no es constante ni suficiente para la incubación de los huevos, esta lagartija es ovovivípara y pare sus crías vivas o bien nacen instantes después de la puesta. Sin embargo, en las zonas meridionales de su área, como sucede en ciertos puntos de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, donde las temperaturas son más benignas, la eclosión puede retrasarse varios días después de la puesta. Esta consta de 3 a 15 huevos, que miden 11,5 por 9 mm. Como sucede en otras lagartijas, no alcanza la madurez sexual hasta los tres años de edad.

*DISTRIBUCION.* En España hay dos poblaciones aisladas entre sí, una en los Pirineos y otra en la Cordillera Cantábrica, y zonas próximas de Santander y Asturias.



Arriba, Lagartija de turbera (*Lacerta vivipara*); abajo, Lagarto ágil (*Lacerta agilis*)