


Lacerta schreiberi BEDRIAGA, 1878. Lagarto verdinegro.

DESCRIPCION. Cabeza corta y ancha. Cola dos veces la longitud de la cabeza y cuerpo. Dos posnasales. Occipital grande, de forma trapezoidal. Masetérica distinta y timpánica ausente. 19 a 27 escamas gulares. Collar formado por 10 a 13 escamas. Escamas dorsales grandes y aquilladas, en número de 48 a 58 en el centro del cuerpo. Ventrals en ocho series longitudinales y de 27 a 33 series transversales. De 11 a 18 poros femorales en cada lado y de 22 a 26 lamelas bajo el cuarto dedo. Los jóvenes son de color pardo verdoso, con 3 a 5 series longitudinales de manchas a cada lado, de color blanco o amarillo y rodeadas de negro. El vientre y la cola son amarillentos. Esta coloración persiste en algunas hembras adultas, aunque la mayoría presentan el dorso de color pardo o verdoso con dos series de grandes manchas bordeadas por otras más pequeñas en los costados. Entre ambas hay una línea clara nítida. Los machos son verdes, finamente vermiculados de negro en todo el cuerpo. El vientre es amarillo yema fuertemente moteado de negro. Durante el celo

la garganta del macho adquiere un color azul cobalto muy contrastado.

LONGITUD TOTAL. Hasta 400 mm.

BIOLOGIA. El lagarto verdinegro es uno de los más bellos y desconocidos de nuestros lagartos. Vive generalmente en los lugares húmedos de las regiones costeras atlánticas y en las proximidades de los arroyos en las montañas. Su predilección por el agua le lleva a arrojarse a ella en los momentos de peligro, e incluso suele permanecer oculto en el fondo durante unos minutos. En un caso he comprobado que la entrada de su guarida se situaba bajo el agua y el animal, en este caso un macho, debía sumergirse en cada ocasión que entraba o salía de ella. De hábitos arborícolas, muchos subadultos prefieren vivir en los matorrales espesos, donde encuentran abundante comida y se hallan a salvo de sus depredadores. En cambio, los adultos viven en el suelo, donde excavan sus escondrijos, aunque ocasionalmente cazan en los matorrales. Cuando son perseguidos a veces trepan rápidamente por los troncos de los árboles, guareciéndose a gran





Lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*); macho (abajo) y hembra (arriba)

altura. Los lagartos verdinegros son muy territoriales y en la época del celo la garganta azul de los machos actúa como distintivo fanérico, advirtiendo a los competidores y atrayendo a las hembras. Las paradas nupciales tienen lugar en mayo, y en el mes de junio ponen de 13 a 21 huevos que miden 13,7-16,7 × 9,7-11,2 mm. Como sucede en los demás reptiles, el número de huevos de cada puesta depende de la edad y tamaño de la hembra.

DISTRIBUCION. Endemismo ibérico, vive en el Sistema Central, Portugal, Galicia y Asturias. También vive en la zona norte de León y de Burgos.

Lacerta viridis (LAURENTI), 1786. Lagarto verde.



Arriba, Lagarto ocelado joven (*Lacerta lepida*); abajo, Lagarto verdinegro joven (*Lacerta schreiberi*)