


**Lacerta viridis** (LAURENTI), 1786. Lagarto verde.

*DESCRIPCION.* Morro largo y obtuso. Rostral en contacto con la cavidad nasal. Dos postnasales superpuestas y cuatro supralabiales anteriores a la subocular. Gránulos entre las supraoculares y las supraciliares ausentes. Occipital triangular, de pequeño tamaño. Dos grandes escamas temporales debajo de las parietales. Masetérica presente, pero casi siempre la timpánica no se distingue. Pliegue gular distinto. De 16 a 25 escamas gulares. Collar formado por 7-12 escamas. Escamas dorsales romboidales y aquilladas, en número de 42 a 50, en el centro del cuerpo. Seis series longitudinales y de 22 a 26 lamelas bajo el cuarto dedo. Las jóvenes son de color marrón verdoso o gris con una o dos bandas laterales blancuzcas muy nítidas, que a veces persisten en la hembra adulta. Adultos de color verde, muy manchados de negro. Los machos en celo tienen la garganta azul cobalto. El vientre, al igual que en las hembras, es de color amarillo yema.


*LONGITUD TOTAL.* Hasta 400 mm.

*BIOLOGIA.* El lagarto verde es una especie bastante afín a la anterior, con la que se le confunde algunas veces. Frecuenta los prados de abundante hierba y los matorrales próximos, en donde se camufla con facilidad. Su alimentación básica se compone de insectos, complementado con moluscos, gusanos y arañas. Se ha podido comprobar que en ocasiones de mucho peligro



Lagarto verde (*Lacerta viridis*)

se arroja al agua y se esconde en el barro del fondo. El período de invernada se extiende desde noviembre a finales de marzo, variando según las condiciones ambientales. La época del celo tiene lugar en abril, y uno o dos meses más tarde las hembras ponen de 6 a 21 huevos que miden  $15-18 \times 8-11$  mm. Para protegerlos de los predadores los ocultan bajo una piedra o bien los entierran entre las raíces de los matorrales. El período de incubación varía entre 60 y 105 días, y en el momento de la eclosión las crías miden 69 a 86 mm. El lagarto verde no alcanza la madurez sexual hasta su tercer año de vida. Se han mantenido ejemplares en cautividad durante diez años.



**DISTRIBUCION.** Pirineos, Montseny, Sistema Ibérico Septentrional, País Vasco, Santander y este de Asturias. También se encuentra en el norte de León y de Burgos.