

V O Y A G E S
D E 12 - 396
M. P. S. P A L L A S,
EN DIFFÉRENTES PROVINCES
DE L'EMPIRE DE RUSSIE,
ET DANS L'ASIE SEPTENTRIONALE;
TRADUITS DE L'ALLEMAND,
*Par M. GAUTHIER DE LA PEYRONIE, Commis des Affaires
Étrangères.*

Cinq volumes in-4°., et un de Planches.

TOME TROISIÈME.



A P A R I S;
Chez MARADAN, Libraire, rue du Cimetière Saint-
André-des-Arts. N°. 9.

M. D C C. X C I I I.

Fishes.

longior, utraque denticulata, ut et lingua cum palato. *Irides* flavescenti-argenteæ, *pupilla* antice angulata. *Corpus* microlepidatum, latiusculum, crassum; linea lateralis æqua, recta. *Pinnae dorsales* maculosæ, præsertim masculis, prior rad. 12-13. *P. pectorales* lutescentes, rad. 16. *ventrales* subruberæ r. 10. *appendicula* lanceolata, plana; *P. ani* intensius rubens rad. 12. *Cauda* fusco-rubescens, bifida. *Color* subaureolus, in dorso suscens, punctis in musculo sparsis fuscis; abdomini flavescentia.

Abundat in fluentis atque torrentibus saxosis rapidissimis Sibiriae montanæ orientalioris, colligiturque præsertim circa cataractas; vulgatissimus præsertim piscis in Jenisea fluvio eumque influentibus aquis. *Magnitudo* summa ulnaris. *Cara* alba sapidissima.

23. CYPRINUS *rivularis*. Russis passim *Golëian*.

Magnitudo Aphyæ, circiter bipollicaris. *Caput* obtusum; subtetragonum, vertice poris sparsis magnis excavato. *Corpus* tereti-compressiusculum, squamis vix conspicuis; *Linea lateralis* recta, ad caput subadscendens. *Pinna* dorsi pone æquilibrium rad. 8. *pectorales* rotundatæ, ventrales anique rad. 8. proter accessorium. *Pinnae* omnes caudaque bifurca pallidæ. *Color* subargenteus, lituris fuscis maculosus. *Irides* argenteæ.

Habitat cum cobitide barbatula in rivulis minimis lacunisque montanis circa montes Altaicos, aliorumque piscium penuria cribris capitur.

*Amphibia.*24. LACERTA *arguta*.

L. agili brevior, ventricosior, rostro acutiore. *Collare* squamis obsoletis, ast plica sub collo duplex, insignis; Callosa puncta in femoribus obsoleta, pauciora. *Cauda* longe brevior, basi crassiuscula, subito adtenuata, extremo filiformi. *Color*

subtus albus, supra glaucus, fasciis crebris transversis nigris, in corpore saepe subconfluentibus, per caudae basin semper distinctissimis, quarum singula continet puncta ocellaria quaterna, quinave, dorsi colore.

Habitat in aridis, glareosis, apricis ad Irtin australiorem, rarius circa M. Caspium, inque deserto arenoso finitimo.

25. SCARABEUS *Spireae.*

Amphibia.

Insecta.

Inter Sc. arboreos minimus, vix Chrysomelam mediocrem sequans, forma Horticolæ. *Corpus* et thorax nigra, cano-pubescentia; *Elytra* grysea, sutura et marginé fusca, tenerrime pubescentia, abdomine paulo breviora. *Pedes* picci.

Apparet Maio, Junioque in floribus variis, præsertim spiræa crenata, rarius ad Volgain, in Sibiria campestri frequens.

26. TENEBRIO *leucogrammus.*

Apterus, ater, nitidulus, ovatus subtus gibbus, forma et magnitudine T. muricato simillimus. *Clypeus* punctis prominulis scaberrimus, margine laterali deflexo. *Elytra* coalita, utrinque latere carinata strigis singula quinis levigatis, usque ad basin vel extremitate tantum albo polline vel tomento incrassatis, quarum intervalla s. porci, punctis prominulis exasperantur. *Tibiae* anticae latiusculæ, exterius serratae. Abundat in arenis ad Irtin australiorem.

27. TENEBRIO *buprestoides.*

Magnitudo Scarab. fossoris; ovalis depresso, apterus, ater glaber. *Clypeus* convexus, corpore paulo latior, utrinque insigniter marginatus, vix evidenter punctatus. *Elytra* conata, postice subacuta, levissima. *Tibiae* anticae compressæ, exteriore margine denticulata.