

нашихъ четырехъ экземпляровъ два добыты Н. М. Пржевальскимъ въ Ордосѣ, два другие найдены А. М. Ломоносовымъ въ восточной Монголіи близъ колодца Ара-цаганъ-унъ-худукъ.

10. *Podarces (Eremias) quadrifrons, n. sp.*

Табл. IV, ф. 2.

E. supra olivaceo-cinerea, lateribus trunci, caudae basi, nec non artibus posterioribus plus minusve rufescentibus, subtus ex flavo albicans. Capite irregulariter nigro maculato, dorso fasciis duabus longitudinalibus griseo-albicanibus, interrupte nigro marginatis, lateribus maculis albis vel coeruleis, nigro circumcinctis, in duas series longitudinales dispositis et in caudae basin porrectis, ornatis; artibus supra nigro alboque maculatis, femoribus praeterea in facie posteriore macula ovali magna, alba, nigro circumscripta, notatis; cauda utrinque fascia longitudinali fusca, parum distincta, ornata. Capite elongato, trunco subfusiformi, cauda longa; scutello internasali simplici, haud diviso, frontonasalibus quatuor, internis magnis latis contiguis, externis angustissimis, sublinearibus; suboculari supra tria scutella supralabialia posito, oris marginem non attingente; collari libero, arcuato et scutellis 10 majoribus obsoito; scutellis gularibus trium parium anteriorum contiguis; scutellis abdominalibus in 32 series transversas et 14—16 obliquas, angulo aculo, retrorsum spectanti, convergentes, dispositis; poris femoralibus utrinque 13; scutellis tibialibus scriei externae magnis, transverse valde dilatatis et cetera magnitudine triplo vel ipse quintuplo superantibus.

Longitudo totius animalis 138 mm.; capitis cum collo 21 mm.; trunci 39 mm.; caudae 78 mm.

Habitat in deserto Alaschanico (specimen singulum).

Главнейший отличительный признакъ этого нового вида состоять въ присутствіи четырехъ лобоносовыхъ щитиковъ, лежащихъ другъ подъ друга; изъ нихъ наружные весьма узкие, почти линейные. Кроме этого признака *E. quadrifrons* отличается отъ двухъ предыдущихъ видовъ, *E. Brenchleyi* и *E. argus*, съ которыми онъ наиболѣе сходенъ по окраскѣ и рисунку, простымъ, нераздѣльнымъ междуносовымъ щитикомъ.

Туловище довольно длинное, нѣсколько веретенообразное. Голова длинная, высокая и узкая; хвостъ мало по малу заострающейся и имѣетъ умѣренную длину, такъ какъ онъ превосходитъ длину головы и туловища, взятыхъ вмѣстѣ, на одну четверть. Переднія ко-

нечности довольно длинные, будучи обращенными впередь и прижатыми къ туловищу, онъ почти достигаютъ конца морды; задня же сравнительно короче, приведенная въ подобное же положение онъ достигаютъ только до пазухъ. Междуносовой щитикъ простой, нераздѣльный, отдѣляется отъ большаго переднечелюстнаго щитика соприкасающимися другъ съ другомъ верхними носовыми; переднія его края, соединяясь другъ съ другомъ, образуютъ прямой уголъ, задній край представляетъ четыре дугообразныхъ выемки, изъ которыхъ среднія вдвое больше краевыхъ, и каждая изъ выемокъ въ отдаленности принимаетъ передній конецъ одного изъ четырехъ лобоносовыхъ щитиковъ. Два среднихъ лобоносовыхъ щитика довольно велики, имѣютъ форму неправильного пятиугольника и соприкасаются другъ съ другомъ на срединѣ морды. Крайніе же лобоносовые щитики, какъ уже выше сказано, весьма узки, почти линейны, на переднемъ концѣ болѣе широкіе, а на заднемъ сильно простирающіеся. Съ каждой стороны головы имѣется по два надбровныхъ щитика почти одинаковой величины, которые вмѣстѣ составляютъ овальную фигуру, окаймленную только спереди и снаружи зернышками, внутри и сзади непосредственно соприкасающуюся съ соседними щитиками. Подглазный щитикъ помѣщается надъ тремя верхнегубными щитиками, именно надъ 6-мъ, 7-мъ и 8-мъ, и слѣдовательно недостигаетъ свободнаго ротоваго края. Верхняя губа съ каждой стороны покрыта 11-ю щитиками, изъ которыхъ шестой достигаетъ наибольшей величины. Нижній вѣкъ чешуйчатый; виски покрыты многоугольными чешуйками, которая въ верхней ихъ части болѣе выпуклы, нежели въ нижней. Съ каждой стороны довольно большаго, слегка выпуклого подбородочнаго щитика лежитъ по одиннадцати нижнегубныхъ щитиковъ, сильно удлиненныхъ, исключая трехъ послѣднихъ очень мелкихъ и почти чешуеобразныхъ. Между нижнегубными щитиками имѣется пять паръ горловыхъ, изъ которыхъ три переднія соприкасаются другъ съ другомъ въ срединной горловой линіи. Спина покрыта зернообразными, слегка выпуклыми чешуйками, которая переходятъ на основаніи хвоста въ болѣе крупные, совершенно плоскія и нереброносныя. Ошейникъ свободенъ, значительно дугообразный, на заднемъ краѣ покрытъ десятью крупными щитиками; грудные и брюшные щитики расположены въ 32 поперечныхъ ряда, изъ которыхъ самые длинные содержать по 16 щитиковъ. Небольшое пространство передъ заднимъ проходомъ покрыто плоскими чешуйками, изъ которыхъ среднія немнога крупнѣе боковыхъ. Бедреныхъ железокъ съ каждой стороны по 13. Внутренняя сторона голеней покрыта крупными щитиками, распо-

ложеными въ нѣсколько рядовъ, изъ которыхъ виѣшній содержитъ наибольшіе щитики, превосходящіе остальные отъ 3 до 5 разъ.

Окраска и рисунокъ. Основный цвѣтъ верхней стороны оливково-сѣрый, представляющій на бокахъ туловища, основаніи хвоста и въ особенности на заднихъ конечностяхъ болѣе или менѣе ясный рыжеватый оттѣнокъ. Нижняя сторона одноцвѣтная, желтовато-блѣлая. Голова сверху и съ боковъ испещрена неправильными черными пятнами. На спинѣ, около линіи, соотвѣтствующей позвоночному столбу, тянутся отъ затылка до основанія хвоста двѣ блѣвато-сѣрыя продольныя полосы, имѣющія съ каждой стороны по довольно широкой черной каймѣ, мѣстами прерывающейся; вмѣстѣ съ тѣмъ блѣвато-сѣрыя полосы на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ черная кайма прервана, окрашены менѣе ярко и поэтому кажутся также прерванными. Ниже этихъ полосъ бока туловища украшены двумя продольными рядами перемежающихся болѣе или менѣе ясно другъ съ другомъ черныхъ кружковъ, изъ которыхъ верхніе внутри блѣлы а нижніе слегка синеваты, (при жизни, вѣроятно, синіе). Самая нижняя часть боковъ блѣлая, отдѣленная отъ желтовато-блѣлаго брюха болѣе или менѣе ясной продольной черной полосой. По бокамъ шеи черные кружки сливаются въ сплошныя продольныя полоски, изъ которыхъ верхняя тянется черезъ виски къ глазу, а нижня на большой подглазный щитикъ. На основаніи хвоста имѣются сѣровато-блѣлая пятна съ мало-ясными черными каймами; остальная часть хвоста сверху одноцвѣтна и только по бокамъ представляетъ не совсѣмъ ясную продольную черную полосу. Конечности украшены блѣмы или рыжевато-блѣмыми кругловатыми пятнами, съ болѣе или менѣе полнымъ темнымъ окаймленіемъ, которое наиболѣе ясно выражено на большомъ овальномъ пятнѣ, украшающемъ заднюю часть бедеръ.


Размѣры. Общая длина 138 мм.; длина головы и шеи, отъ конца носа до заднаго края ошейника, 21 мм.; длина туловища 39 мм.; длина хвоста 78 мм.

Мѣстонахожденіе. Единственный экземпляръ этого вида добытъ Н. М. Пржевальскимъ въ Ала-шанской пустынѣ.

11. *Podarcis (Eremias) Kessleri, n. sp.*

Табл. V.

E. supra aurantiaco-cinerea vel rufo-grisea, irregulariter aurantiaco guttata, capite obscuriore et fusco vermiculato; dorso maculis, plus minusve numerosis, irregularibus, nigris, interdum confluentibus



Tafel IV fig. 2 Podarces (Eremias) quadrifrons

