

assai ricercata dagli appassionati di terraristica, che ogni anno scendono in Corsica e Sardegna per catturarla. In Corsica è comune e abbastanza diffusa, in Sardegna è pure comune ma assai localizzata. In genere (almeno in Sardegna) è sconosciuta ai locali; i pochi sardi che la conoscono la chiamano « Argilèstru nièddu, Caliscèrtula pizonina, Zirichèlta pintàda o Caliscèrtula, Caluxèrtula, Tiliguèrta, Tilighèlta nièdda ». In cattività è preferibile tenerla isolata da altre sp. di lucertole e con pochi es. per terrario. Sebbene una ♀ allevata da H. Pope sia vissuta 17 anni, in genere non supera in terrario i 6 anni di vita. Può rimanere digiuna fino a 2 settimane ma se non beve spesso muore in pochi giorni.

#### LUCERTOLA DI HORVATH

*Lacerta horvathi*

Méhely, 1904

(Figg. 40, 52)

I: Horvath Wall Lizard - T: Kroatische Gebirgseidechse.

CARATTERI DISTINTIVI – A prima vista simile a una *Podarcis muralis* a dorso bruno ma: V subrettangolari, sempre più di 40 Sqd lisce a metà tronco, nella coda (se integra) si alternano anellature evidentemente più corte e più lunghe, di regola la sopranasale separa la postnasale dall'internasale, la stria occipitale è spesso assente. Lt ad. 11-18 cm (♀ minore).

DISTRIBUZIONE – Alpi Carniche (monti Ponza e Mangart), Alpi Giulie, Istria (monte Maggiore = Učka), Croazia sud-occid. (massicci del Velebit e Kapela).

HABITAT – Massi e pareti rocciose in località boschive al margine della vegetazione, ma anche su pietraie con arbusti in aree assolate; da 600 a 2000 m (Italia).

MODO DI VITA – (Secondo E. Schreiber e altri). Simile a quello di *P. muralis* con la quale coabita solo in alcune stazioni: la separazione dipende forse o da competizioni alimentari o da differenze dovute al diverso microclima a cui le 2 sp. sono legate: infatti la Lucertola di Horvath sembra essere meno termofila della Lucertola muraiola; di conseguenza *L. horvathi* si spinge spesso ad altitudini maggiori di quelle raggiunte dalla *P. muralis*. È meno veloce di *P. muralis*. A quote minori convive con la Lucertola vivipara e la muraiola, e in primavera esce più tardi di queste 2 sp.

RAPPORTI CON L'UOMO – Regolarmente scambiata con la Lucertola muraiola e spesso con questa confusa anche da alcuni studiosi. Come quest'ultima è oggi protetta in Slovenia.

#### LUCERTOLA OCELLATA

*Lacerta lepida*

Daudin, 1802

(Figg. 34, 35, 41)

I: Ocellated Lizard - F: Lézard ocellé - T: Perleidechse.

CARATTERI DISTINTIVI – V trapezoidali a margini laterali obliqui; Sqd lisce o debolmente carenate nella metà poster., in numero non inferiore a 63 in linea trasversa a metà tronco; placca occipitale posteriormente di solito più larga della frontale. Ad.: colorazione fondamentale del dorso verde, fianchi coperti da una serie di macchie circolari nere a nucleo azzurro; giov.: colorazione fondamentale grigio chiaro, verde giallastro od ocra, con macchie circolari nere a nucleo celeste disposte sul dorso e sui fianchi. Il ♂ ad. si riconosce dalla ♀ per avere il capo più grande e massiccio, i pori femorali molto evidenti e, nel periodo degli amori, le macchie circolari sui fianchi blu intenso. Lt ad. 45-90 cm; ♂ maggiore.




FIG. 40 - Lucertola di Horvath (*Lacerta horvathi*), Mangart, Friuli: 2) adulto; C) squame dell'apice del muso; D) testa; 4) tratto di coda con anellature alternate corte e lunghe.




FIG. 52 – Distribuzione di: 1) *Lucertola* di Horvath (*Lacerta horvathi*); 2) *Lucertola* adriatica (*Podarcis melisellensis*); 3) *Lucertola* campestre (*Podarcis sicula*); 4) *Lucertola* siciliana (*Podarcis wagleriana*).