

un résultat qui rappelle le résultat bien connu obtenu par des chiens, qui coupent et avalent des pointes d'herbe.

Oiseaux. — Les mâles du Troglodyte mignon (*Anorthura troglodytes* L.) très abondant dans nos régions, se livrent de violents combats aux époques des amours. En avril dernier, M. GERBAULT surprit de la sorte deux mâles. Ils se battaient avec un tel acharnement qu'ils tombaient à terre, et leur attention était tellement absorbée par l'ardeur de la bataille que notre Collègue s'empara d'eux sans difficulté.

M. LÉBOUCHER dit qu'il a vu un Cormoran (*Phalacrocorax carbo* Dum.) tué récemment sur un sapin dans le parc de Chauvigny à Saint-Germain-du-Corbéis. M. LETACQ observe que cet oiseau sédentaire et assez commun sur le littoral se voit presque chaque année au bord de nos étangs ou de nos rivières ; ainsi dernièrement un individu mâle fut tué à Couterne sur la Mayenne.

M. LETACQ dit que la Perdrix rouge (*Perdix rubra* Briss.) autrefois desséminée sur toute la surface du département de l'Orne, n'y paraît plus aujourd'hui que d'une façon accidentelle ; mais comme elle reste commune dans la majeure partie du département de la Sarthe, il n'y a guère d'année où plusieurs couples ne viennent nicher aux environs d'Alençon : ainsi en 1920, on en a vu à Saint-Céneri-le-Géret, à Ciral et sur nos limites à Villepail (Mayenne).

Lacerta stirpium Daud. — M. LETACQ présente un

exemplaire du Lézard des souches capturé dans les bois de la Jouxrière à Hesloup. Cette nouvelle observation montre que l'espèce, sans être fort abondante, se voit sur plusieurs points autour d'Alençon ; elle a été en effet trouvée dans les bois de Noë-de Gesnes, des Aulnais, de l'Isle, sur la butte Chaumont et en Ecouves.

Brochet. — M. LETACQ montre la photographie d'un Brochet (*Esox lucius* L.) pris au lancer le 22 mars 1920, à l'étang du Mortier, près d'Alençon : longueur 1^m12, largeur 0^m22 ; poids 14 kilos. Il en signale un autre capturé en juin dernier, dans la Sarthe, à Saint-Céneri-le-Géret, mesurant 1^m04 de longueur et du poids de 8 kilos.

Guêpes. — M. LEBOUCHER dit que les Guêpes vulgaires (*Vespa vulgaris* L.) furent très rares cette année et ne se sont montrées qu'assez tard, vers le 15 août, mais qu'en revanche les Frêlons (*Vespa crabro* L.) furent très communs.

M. LETACQ montre un nid de Poliste française (*Polistes gallica* L.) pris au Chevain, en juillet dernier, sur un arbrisseau.

Mollusques. — M. LETACQ montre un exemplaire de *Limax fulvus* Norm. et dit qu'il a trouvé cette année en assez grande abondance sur les champignons cette espèce regardée comme rarissime. Les dernières observations lui ont prouvé que *Limax arborum* Bouch. et *Arion tenellus* Mill. sur la répartition géographique desquels on n'avait encore que des notions peu précises, devaient être rangés parmi nos espèces communes.