

P. S. Pallas

D. A. D. Professors der Natur-Geschichte und ordentlichen Mitgliedes der
Russisch-Kaiserlichen Academie d. W. der freyen Deconomischen Gesellschaft
in St. Petersburg, wie auch der Römisch-Kaiserlichen Academie der
Naturforscher und Königl. Engl. Societät;

Reise

durch

verschiedene Provinzen

des

Russischen Reichs.

Erster Theil.



St. Petersburg,

gedruckt bey der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften 1771.

ferme ad basin, proxima ad medium oblique albae, rhachi *Auesi*
men nigra, versus apicem dilatata. *Pedes* corneolo, fuscescen-
tes. *Femina* caret nigredine verticis atque gulæ, ceterum si-
millima. Obs. ad Iaicum autumno.

11. LACERTA helioscopa.

Facies Lacertae Mauraæ, longitudi digiti. Caput totum *Amphibia*.
callis verruculosum, retusissimum, vix labiis paululum promi-
nulis naribusque frontalibus. *Supercilia*, subsquamata, palpebrae
æquales, punctulatae, margine grossius granulato. *Collum*, qua-
si filo constrictum, subtus plica transversa; ceruix ad ipsos hu-
meros tuberculo obliquo muricato, cum areola saepe coccinea
adiacente. *Corpus* breue, lateribus ventricosum, subtus squa-
mulis acutis aequalibus, supra minoribus prominulis, sparsisque
verrucis muricatis maxime versus latera obstitut. *Cauda* aequa-
liter squamata, basi crassa, dein subfiliformis, in apicem adte-
nuata. *Color* supra exalbido gryfeus cinereusue, guttulis fuscis
glaucisque saepe adpersus, et araneofus, subtus albidos; apex
caudæ supra fuscus, subtus miniaceus, coccineusue, raro palli-
dus. — In deserti australioris collibus ardentiissimis copiosa, in-
solatur capite surrecto et plerumque soli obuerso; Cursu celer-
tima, sed minus serpantino quam *Lacerta agilis*.

12. LACERTA velox.

Multo minor et gracilior *Lacerta agili*, sed facie simili-
ma. Caput, collare squamosum, monile per femora, caudaque
verticillata, vt in illa. *Color* constans supra cinereus, strigis
longitudinalibus quinis, paulo dilutioribus, quibus adstant atomi
fusci copiosi, sed media vix ultra ceruicem continuata. *Latera*
corporis longitudinalibus maculis maioribus nigris, interspersisque
punctis coeruleofaciens nitidis. *Pedes* postici areolis orbiculatis
dilutioribus. — Inter faxa circa Inderskiensem lacum, atque
in deserti locis aestuofissimis vagabunda, telo velocior.

13. LACERTA cruenta.

Forma circiter praecedentis, fere triplo minor et capite
acutiore. *Collum* nullum nisi plica transversa, neque monile per
femora. *Corpus* subtus album, supra fuscum, strigis ceruicis
septem